

UK Information and directions for use

Pharmaceutical entrepreneur: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Manufacturer: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica Contralck Plus

Method of administration: Solution for adding to aquarium water

Amount of active ingredients per 1 ml of solution: 2.5 mg of methylthioninium chloride, 1.0 mg of malachite green oxalate, 0.3 mg of acriflavinium chloride

Areas of application: White spot disease (Ichthyophthirius multifiliis)

and other skin and gill parasites such as Trichodina and Chilodonella.

Disease symptoms: White spots or patches on skin and fins, shaky and rubbing movements, clamped fins, rapid breathing, dull mucous membranes.

Contraindications and side effects: None known. The pet owner is respectively asked to inform a veterinarian or pharmacist of any newly-discovered side effect. The pet retailer or product manufacturer should also be informed of any side effects.

Remedy for freshwater tropical fish

Dosing instructions/Method of application: Shake well before use. The treatment cycle for Tetra Medica Contralck Plus lasts for 8 days. During treatment, please ensure that the aquarium is well aerated. Switch off any UV clarifiers and ozone systems. Do not use activated carbon or any other absorbent filter media to filter the water. Wherever possible, please clean the filter properly before use. Always ensure that treatment is carried out whilst the tank is fully stocked to prevent any currently healthy animals from subsequently becoming infected. Dispense Tetra Medica Contralck Plus evenly into the aquarium in the amounts as stipulated below:

Day 1: 20 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.

Day 2: 20 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.

Days 3 to 6: No application. Feed as normal.

Day 7: 20 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.

Day 8: No application. Feed as normal. Carry out a partial water change (30–50%). After the partial water change we recommend you to use activated carbon to filter the water.

Repeat treatment is recommended directly afterwards, particularly if white spot disease persists.

Water discoloration is due to the active substance and will disappear after a few days.

Instructions for appropriate use:

- Do not use Tetra Medica Contralck Plus in conjunction with any other disease remedies
- If excessive amounts of the product are added to the aquarium, carry out a partial water change equivalent to those amounts.

Special storage precautions:

- Keep this remedy out of the reach and sight of children.
- Store the product in its original packaging.
- Keep the product away from sunlight.

Special precautions:

- For animal treatment only.
- Do not use once the expiry date has passed.
- This product should not be used on crustaceans, shrimps, snails, mussels and other invertebrates as it can lead to intolerance.
- May be harmful to delicate plant species such as Ceratophyllum genus (hornwort).
- Special precautionary measures for disposal of unused remedies:
- Dispose of this product and its packaging at a hazardous or special waste collection point.

Information revised:
January 2022

D Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Importeur für die Schweiz: fishmed GmbH, Ruchfeldstr. 15, CH-4142 Münchstein, Switzerland, Tel.: +41 (0) 61 416 10 10

Hersteller: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica Contralck Plus

Mode d'administration: Solution pour ajouter à l'eau de l'aquarium

Quantité d'ingrédients actifs par 1 ml de solution: 2,5 mg de chlorure de métolitioninio, 1,0 mg d'oxalate de verte de malachite, 0,3 mg de chlorure d'acriflavium

Champs d'application : maladie des points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) et autres parasites de la peau et des branches tels que Trichodina et Chilodonella.

Symptômes de la maladie : points blancs ou dépôts sur la peau et les nageoires, tremblements et mouvements de frottement, nageoires bloquées, respiration rapide et opacité des muqueuses.

Contre-indication et effets secondaires : Aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer un vétérinaire ou un pharmacien, ainsi que votre boutique d'aquarophilie ou le fabricant du produit.

Medicament pour poissons d'ornement d'eau douce

Instructions de dosage/mode d'application : bien agiter avant usage. Pour Tetra Medica Contralck Plus, le cycle de traitement dure 8 jours. Pendant le traitement, s'assurer que l'aquarium est bien aéré.

Éteindre toutes les lampes UV et systèmes d'ozone. Ne pas utiliser de filtre actif ou tout autre matériau filtrant absorbant pour filtrer l'eau. UV-Kläre und Ozon-Anlagen ausschalten. Nicht über Aktivkohle oder andere absorbiende Filtermedien filtern. Wenn möglich bitte Filter vor der Anwendung besch- und sachgerächten. Die Behandlung immer im vollbesetzten Becken durchführen, um eine Ansteckung noch nicht befallener Tiere zu verhindern. Tetra Medica Contralck Plus wie folgt in den angegebenen Mengen gleichmäßig im Aquarium verteilen:

1. Tag: 20 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.

2. Tag: 20 tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.

Jour 3 à 6: No application. Feed as normal.

Jour 7: 20 drops (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.

3. - 6. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern.

7. Tag: 20 tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.

8. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern. Teilwasserwechsel (30–50%) durchführen. Wir empfehlen nach dem Teilwasserwechsel mit Aktivkohle zu filtern.

Eine Wiederholungsbehandlung ist direkt im Anschluss empfehlenswert, besonders bei der Weißpunktchenkrankheit.

Die Wasserfärbung ist wirkstoffbedingt und verschwindet nach einigen Tagen wieder.

Hinweise für die bestimmungsgemäße Anwendung:

- Tetra Medica Contralck Plus nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Im Falle einer Überdosierung entsprechend der Überdosierungsmenge das Aquarienwasser wechseln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:

- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufzubewahren.
- In der Originalverpackung aufzubewahren.
- Vor Lichteinstrahlung schützen.

Besondere Warnhinweise:

- Für Tiere.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Krebstiere, Garnelen, Schnecken, Muscheln und andre Wirbellose von der Behandlung auszuschließen, da Unverträglichkeiten auftreten können.

Spezielle vorzugsmaatregeln voor het bewaren:

- Conserver le médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine.
- Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil.

Précautions particulières de stockage :

- Pour traîter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moulus et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln:

- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemballentensorgung zu führen.
- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemballentensorgung zu führen.

Précautions particulières :

- Pour traiter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moulus et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.

Peut se révéler nocif pour les espèces de plantes fragiles, comme celles du genre Cératophyllum (anthocétones).

Mesures de précaution particulières pour l'élimination des médicaments non utilisés :

Éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stand der Information:

Januar 2022

F Informations et instructions d'utilisation

Impresario farmaceutico: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemania, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Fabricado na Alemanha, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Alemania

Tetra Medica Contralck Plus

Mode d'administration : Solution pour ajouter à l'eau de l'aquarium

Ingrediénts actifs pour 1 ml de solution : 2,5 mg de chlorure de méthylthioninium, 1,0 mg d'oxalate de verte de malachite, 0,3 mg de chlorure d'acrilavium

Champs d'application : maladie des points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) et autres parasites de la peau et des branches tels que Trichodina et Chilodonella.

Symptômes de la maladie : points blancs ou dépôts sur la peau et les nageoires, tremblements et mouvements de frottement, nageoires bloquées, respiration rapide et opacité des muqueuses.

Contre-indication et effets secondaires : Aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer un vétérinaire ou un pharmacien, ainsi que votre boutique d'aquarophilie ou le fabricant du produit.

Medicament pour poissons d'ornement d'eau douce

Instructions de dosage/mode d'application : bien agiter avant usage. Pour Tetra Medica Contralck Plus, le cycle de traitement dure 8 jours. Pendant le traitement, s'assurer que l'aquarium est bien aéré.

Éteindre toutes les lampes UV et systèmes d'ozone. Ne pas utiliser de filtre actif ou tout autre matériau filtrant absorbant pour filtrer l'eau. UV-Kläre und Ozon-Anlagen ausschalten. Nicht über Aktivkohle oder andere absorbiende Filtermedien filtern. Wenn möglich bitte Filter vor der Anwendung besch- und sachgerächten. Die Behandlung immer im vollbesetzten Becken durchführen, um eine Ansteckung noch nicht befallener Tiere zu verhindern. Tetra Medica Contralck Plus wie folgt in den angegebenen Mengen gleichmäßig im Aquarium verteilen:

1. Tag: 20 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.

2. Tag: 20 tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.

Jour 3 à 6: No application. Feed as normal.

Jour 7: 20 drops (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.

3. - 6. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern.

7. Tag: 20 tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.

8. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern. Teilwasserwechsel (30–50%) durchführen. Wir empfehlen nach dem Teilwasserwechsel mit Aktivkohle zu filtern.

Eine Wiederholungsbehandlung ist direkt im Anschluss empfehlenswert, besonders bei der Weißpunktchenkrankheit.

Die Wasserfärbung ist wirkstoffbedingt und verschwindet nach einigen Tagen wieder.

Hinweise für die bestimmungsgemäße Anwendung:

- Tetra Medica Contralck Plus nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Im Falle einer Überdosierung entsprechend der Überdosierungsmenge das Aquarienwasser wechseln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:

- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufzubewahren.
- In der Originalverpackung aufzubewahren.
- Vor Lichteinstrahlung schützen.

Besondere Warnhinweise:

- Für Tiere.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Krebstiere, Garnelen, Schnecken, Muscheln und andre Wirbellose von der Behandlung auszuschließen, da Unverträglichkeiten auftreten können.

Spezielle vorzugsmaatregeln voor het bewaren:

- Conserver le médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine.
- Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil.

Précautions particulières de stockage :

- Pour traîter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moulus et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln:

- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemballentensorgung zu führen.
- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemballentensorgung zu führen.

Précautions particulières :

- Pour traîter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moulus et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.

Peut se révéler nocif pour les espèces de plantes fragiles, comme celles du genre Cératophyllum (anthocétones).

Mesures de précaution particulières pour l'élimination des médicaments non utilisés :

Éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stand der Information:

Januar 2022

N Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Impresa farmaceutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemania, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Fabricado na Alemanha, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Alemania

Tetra Medica Contralck Plus

Modality of administration: Agente activo en solución para añadir al agua del acuario

Quantidade

FIN Tiedot ja käyttöohjeet
RUS Информация и инструкции по применению.
PL Informacje i instrukcja stosowania
CZ Informace a návod k použití
TR Bilgiler ve kullanım talimatları
RO Informații și instrucțiuni de utilizare
AR معلومات وإرشادات الاستخدام

Farmasia-alan yritystäjä: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Sakska, puh. +49 (0) 5422/105-0, Valmistettu Sakassa, www.tetra.net
Valmistaja: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany (Germany)

Tetra Medica Contralck Plus
Käytötapa: Liuos akvaarioveteen lisättäväksi
Aktiivisten aineiden määriä 1 ml:ssa ilmouta: 2,5 mg metylitioninikloridia, 1,0 mg malakittivihreä-oksalaattia, 0,3 mg akriflaviinikloridia
Käytösalueet: Valkopilkkutauti (Ichthyophthirius multifiliis) ja muut iho- ja kidusoistot, kuten Trichodina ja Chilodonella.
Sairauden oireet: Valkoisia pilkkuja tai läikkää ihossa ja vissä, epävarmat ja hankevat liikkeet, supusa olevat evät, nopea hengitys, himmeät limakalvot.
Vastasyt ja sivuvaikutukset: Ei tiedossa. Lemminkin omistaja pyydettiin kohtelaisti ilmoittamaan eläintäkästä tai apteekkiin, jos havaitaan uusia sivuvaikutuksia. Myös lemmikkiläitten jälleenmyyjille tai tuottaneille valmistajalle tulisi tiedottaa mahdollisista sivuvaikutuksista.
Lääke mekaniven akvaariokalille
Annotelohuoneet/käytönmenetelmät: Ravista hyvin ennen käyttöä.
Tetra Medica Contralck Plus luo hoitojakso kestää 8 päivää. Varmista hoitona aikana, että akvaario on tuuletettu hyvin. Sammuta mahdoliset UV-leiväntoiput ja otsonjärjestelmät. Alla käytä aktiivisuutta tai muuta absorboivia suodatinaineita veden suodattamiseen. Puhdisti suodatin mahdolisuksien mukaan asianmukaisesti ennen käyttöä. Varmista aina, että hoito suoritetaan akvaarioon ollessa täysin varustettuna, jotta parhaillaan teveiden eläinten tattutumien jälkeenpäin välttetäisiin. Levitä **Tetra Medica Contralck Plus** tasaiseksi akvaarioon alla mainitut maaraannukset.
Päivä 1: 20 tippua (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimaata kalja.
Päivä 2: 20 tippua (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimaata kalja.
Päivät 3–6: Ei annotelua. Ruoki normalisti.
Päivä 7: 20 tippua (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimaata kalja.
Päivä 8: Ei annotelua. Ruoki normalisti. Suorita osittainen vedenvaihto (30–50%). Osittainen vedenvaihdon jälkeen suositteleme aktiivihilien käyttöä veden suodattamiseen.
Hoidon toistoa suosittelaan heti jälkeenpäin, erityisesti, jos valkopilkkutauti jatkuu.
Veden värjäytyminen johtuu aktiivisesta aineesta ja se katoaa muutamassa päivässä.
Ohjeet asianmukaiseen käyttöön:

- Älä käytä **Tetra Medica Contralck Plus** saa yhdessä muiden tautien lääkkeiden kanssa
- Jos tuotteta lisätä akvaarioon liiallisia määriä, suori näitä osia vastaava osittainen vedenvaihto.

Erityiset varotoimet varastointissa:

- Pidä tåmä lääke poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
- Varastoit tuote sen alkuperäispakkauksessa.
- Pidä tuote poissa aurinkovalosta.

Erityiset varotoimet:

- Vain eläinten hoitoon.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Tätä tuotetta ei tulisi käyttää ariäilytelle, kattkaravuille, kotiloille, simpukoille ja muille selkärangattomille, koska se voi johtaa siihen karkotusta.
- Saattaa vahingoittaa herkkää kasvilejä, kuten Ceratophyllum genus (karvalehti).
- Erityiset varotoimenpiteet käyttämättömien lääkkeiden hävittämisessä: Toimita tåmä tuote ja sen pakkaus engelmajätteen tai erityisjätteen vastaanottoon.

Tiedot tarkastettu:
tammikuu 2022

RUS Информация и инструкции по применению.
Фармацевтическое предприятие: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Германия. Тел. +49 (0) 5422/105-0, Выработано в Германии, www.tetra.net
Производитель: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Германия (Германия)

Tetra Medica Contralck Plus
Способ применения: добавить раствор в аквариумную воду.
Содержание активных ингредиентов в 1 мл раствора: 2,5 мг метилитониниклорида, 1,0 мг малакиттывиреа-оксалатта, 0,3 мг акрифланинкlorida
Кäytösaluet: Valkopilkkutauti (Ichthyophthirius multifiliis) ja muut iho- ja kidusoistot, kuten Trichodina ja Chilodonella.
Sairauden oireet: Valkoisia pilkkuja tai läikkää ihossa ja vissä, epävarmat ja hankevat liikkeet, supusa olevat evät, nopea hengitys, himmeät limakalvot.
Vastasyt ja sivuvaikutukset: Ei tiedossa. Lemminkin omistaja pyydettiin kohtelaisti ilmoittamaan eläintäkästä tai apteekkiin, jos havaitaan uusia sivuvaikutuksia. Myös lemmikkiläitten jälleenmyyjille tai tuottaneille valmistajalle tulisi tiedottaa mahdollisista sivuvaikutuksista.
Lääke mekaniven akvaariokalille
Annotelohuoneet/käytönmenetelmät: Ravista hyvin ennen käyttöä.
Tetra Medica Contralck Plus luo hoitojakso kestää 8 päivää. Varmista hoitona aikana, että akvaario on tuuletettu hyvin. Sammuta mahdoliset UV-leiväntoiput ja otsonjärjestelmät. Alla käytä aktiivisuutta tai muuta absorboivia suodatinaineita veden suodattamiseen. Puhdisti suodatin mahdolisuksien mukaan asianmukaisesti ennen käyttöä. Varmista aina, että hoito suoritetaan akvaarioon ollessa täysin varustettuna, jotta parhaillaan teveiden eläinten tattutumien jälkeenpäin välttetäisiin. Levitä **Tetra Medica Contralck Plus** tasaiseksi akvaarioon alla mainitut maaraannukset.
Päivä 1: 20 tippua (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimaata kalja.
Päivä 2: 20 tippua (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimaata kalja.
Päivät 3–6: Ei annotelua. Ruoki normalisti.
Päivä 7: 20 tippua (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimaata kalja.
Päivä 8: Ei annotelua. Ruoki normalisti. Suorita osittainen vedenvaihto (30–50%). Osittainen vedenvaihdon jälkeen suositteleme aktiivihilien käyttöä veden suodattamiseen.
Hoidon toistoa suosittelaan heti jälkeenpäin, erityisesti, jos valkopilkkutauti jatkuu.
Veden värjäytyminen johtuu aktiivisesta aineesta ja se katoaa muutamassa päivässä.
Ohjeet asianmukaiseen käyttöön:

- Älä käytä **Tetra Medica Contralck Plus** saa yhdessä muiden tautien lääkkeiden kanssa
- Jos tuotteta lisätä akvaarioon liiallisia määriä, suori näitä osia vastaava osittainen vedenvaihto.

Erityiset varotoimet:

- Vain eläinten hoitoon.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Tätä tuotetta ei tulisi käyttää ariäilytelle, kattkaravuille, kotiloille, simpukoille ja muille selkärangattomille, koska se voi johtaa siihen karkotusta.
- Saattaa vahingoittaa herkkää kasvilejä, kuten Ceratophyllum genus (karvalehti).
- Erityiset varotoimenpiteet käyttämättömien lääkkeiden hävittämisessä: Toimita tåmä tuote ja sen pakkaus engelmajätteen tai erityisjätteen vastaanottoon.

Tiedot tarkastettu:
tammikuu 2022

PL Informacje i instrukcja stosowania
Farmaceutyczna spółka: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Niemcy, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Wyprodukowano w Niemczech, www.tetra.net
Producent: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Niemcy (Niemcy)

Tetra Medica Contralck Plus
Metoda podawania: Roztok dodawany do wody akwariowej
Składników aktywnych w 1 ml roztworu: 2,5 mg metylitoniny klorida, 1,0 mg malakitowego zelenego oksalatu, 0,3 mg akryflavinyklorida
Obszary stosowania: choroba wywoływana przez Whispovirus (Ichthyophthirius multifiliis) i inne pasożyty skórny i skrzeli, takie jak kąpielniczki i żaberniki parazyti, np. Trichodina i Chilodonella.
Obszary stosowania: choroba wywoywana przez Whispovirus (Ichthyophthirius multifiliis) i inne pasożyty skórny i skrzeli, takie jak kąpielniczki i żaberniki parazyti, np. Trichodina i Chilodonella.
Tetra Medica Contralck Plus
Zastosowanie: dodać roztwór do wody akwariowej
Właściwości chorygające: 2,5 mg metylitoniny klorida, 1,0 mg malakitowego zelenego oksalatu, 0,3 mg akryflavinyklorida
Obszary stosowania: choroba wywoywana przez Whispovirus (Ichthyophthirius multifiliis) i inne pasożyty skórny i skrzeli, takie jak kąpielniczki i żaberniki parazyti, np. Trichodina i Chilodonella.
Tetra Medica Contralck Plus
Metoda podawania: Roztok do přidání do vody v akváriu
Podíl účinných látek na 1 ml roztoku: 2,5 mg chloridu metylitoninu, 1,0 mg oxalátu malachitového zeleného, 0,3 mg chloridu akryflaviny
Pečlivosti pro použití: Alespoň jednou leteckým členěním (ichthyophthirius multifiliis) a další choroby způsobené kožními nebo žaberními parazity jako je Trichodina a Chilodonella.
Uygulama yöntemi: Akvaryum suyun eklenen çözelti
İstekli katkıda bulunan aktif maddelerin miktarı: 2,5 mg metylitoniny klorür, 1,0 mg oxalátu malachitové zeleni, 0,3 mg akryflaviny klorür
Uygulama alanları: Beyaz yüzük hastalığı (Ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Uygulama alanları: Beyaz yüzük hastalığı (Ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Méthode de administration: Solution pour adaugare în apa de acvariu
Concentratie de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyogu: Aşırınca leucokin stigmatis (ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solunga parazitleri.
Tetra Medica Contralck Plus
Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu
Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltoniu, 1,0 mg de oxalat de malachit, 0,3 mg de clorură de acrilflaviniu
Peledi eforiyog